MAXFORCE®
Forte



FICHA TÉCNICA

1. Resumen del producto

Maxforce® Forte es un cebo cucarachicida con una formulación específica para que las cucarachas lo ingieran y se logre su control.
Desarrollada por Envu®, ofrece innovación tecnológica en el desarrollo de geles para los profesionales en el manejo de plagas.
Su especial formulación brinda simplicidad en la aplicación, asegurando una prolongada residualidad, poder de atracción y eficacia del producto.
Maxforce® Forte contiene Fipronil, un ingrediente activo perteneciente al grupo fenilpirazoles de máxima pureza.

Composición	Fipronil 0,05 g - c.s.p.: 100 g Grupo químico: Fenilpirazoles
Uso	Profesional
Agente Amargante	Previene Ingesta Humana
Antídoto	Trate sintomáticamente. No hay un antídoto específico disponible. Se debe considerar el lavado gástrico en casos de ingestión significativa solo durante las primeras 2 horas. Sin embargo, siempre es aconsejable la aplicación de carbono activado y sulfato de sodio.
Formulación	Gel
Registro ISP	N° P-907/26
Clase Toxicología	III
Formato (presentación)	Jeringas x 30 g

envu®

MAXFORCE® Forte

2. Modo de Acción

· Funciona por ingestión y por contacto.

3. Plagas que controla

Tipo de cucaracha	Puntos/Dosis de aplicación
Cucaracha alemana (Blattella germánica) Cucaracha americana (Periplaneta americana) Cucaracha oriental (Blatta orientalis)	0,2 – 0,4 g/m2*

**El tamaño de gota de 3-5 mm y de 5-8mm pesan aproximadamente entre 0,2 y 0,4 g respectivamente.*

4. Modo de Uso

No aplicar gel en áreas donde recientemente se haya aplicado insecticida. No aplicar insecticida sobre el gel ya que actuaría como repelente. La dosis de Maxforce® Forte a aplicar dependerá del grado de infestación de la plaga. Efectuar un minucioso monitoreo previo de la zona afectada, definiendo los lugares (refugios y lugares de tránsito de las cucarachas) donde se aplicarán los puntos dosis/gotas de gel. Pequeñas cantidades de gotas del gel bien distribuidas proveerán un control más rápido de la infestación. Utilizar las dosis más altas con alta infestación de cucarachas donde el gel compita con fuentes alternativas de alimento para el insecto y en lugares con poca higiene. Aplicar Maxforce® Forte donde se refugian y/o agrupan las cucarachas: en esquineros, rendijas, grietas, bajo mesadas, cajoneras, alacenas, cocinas, heladeras, artefactos eléctricos y todo otro lugar donde se pueda observar actividad de las cucarachas.
Identificar y controlar los puntos de aplicación a los siete días de aplicado y reponer el cebo consumido. Reaplicar a los 30, 60 y 90 días hasta que se observe que la infestación ha sido controlada. En zonas con alto registro de reinfestación conviene mantener puntos de cebado como medida preventiva.

envu®

MAXFORCE®
Forte

5. Recomendaciones pre - aplicación

Verificar y corregir las condiciones de higiene y exclusión del área a tratar. Definir los refugios, lugares donde se agrupan y lugares de tránsito de las cucarachas donde se aplicará posteriormente los puntos dosis/gotas de gel. En aplicaciones de exteriores la acción del sol directo y el agua reducen la residualidad del gel. No aplicar puntos gel en áreas donde recientemente se haya aplicado insecticida. Dejar transcurrir un lapso de 7 a 15 días para aplicar el gel cucarachicida.

6. Recomendaciones en la aplicación

Evitar aplicar Maxforce® Forte en áreas que se lavan de forma rutinaria. No aplicar en áreas de excesiva suciedad/grasitud ya que disminuye la atracción del gel. No aplicar en áreas que han sido pulverizadas recientemente con insecticidas, como así tampoco pulverizar directamente sobre el gel ya que el producto se desactivará. No aplicar puntos de gel sobre superficies donde se elaboran alimentos. No aplicar aerosoles directos o de descarga total en zonas donde se aplicó. No utilice el producto en o sobre equipos eléctricos donde existe la posibilidad de riesgo de electrocución. En caso de ser necesaria la remoción del gel de los lugares donde ha sido colocado, utilizar una solución de cloruro de sodio al 5% (sal común). El producto puede manchar materiales textiles y prendas de vestir. Preferentemente manipular con guantes y ropa protectora.

7. Recomendaciones post - aplicación

• Advertir a los usuarios de las instalaciones sobre los lugares donde se aplicaron las gotas gel de Maxforce® Forte.

• No aplicar aerosoles directos o de descarga total en zonas donde se aplicó los puntos gel.

• No pulverizar directamente sobre los puntos gel ya que el producto se desactivará inmediatamente.

envu®

MAXFORCE® Forte

8. Intervalo entre aplicaciones

• Reaplicar los puntos gel cada aproximadamente 30, 60 y 90 días, dependiendo de la infestación presente.

• En zonas con alto registro de reinfestación conviene mantener puntos de cebado como medida preventiva.

9. Efecto Insecticida

• Los atrayentes únicos de la exclusiva formulación de Maxforce® Forte hacen que las cucarachas que se encuentren en un radio de aproximadamente un metro inmediatamente se dirijan al gel y lo consuman.

• Luego de ingerido la acción del ingrediente activo Fipronil es inmediata en el sistema nervioso central del insecto ocasionando el control inmediato.

10. Seguridad

Advierta a los usuarios de las instalaciones sobre las medidas de seguridad y precauciones a tener en cuenta para evitar accidentes.

11. Riesgos ambientales

Dada su especial formulación, Maxforce® Forte posibilita efectuar una aplicación selectiva en todos aquellos lugares donde se requiera un cucarachicida específico.

12. Almacenamiento

• No transportar ni almacenar con medicamentos, alimentos ni forrajes.

• Alejado de niños, personas inexpertas y mascotas.

• Mantener y guardar este producto solo en su envase original bien cerrado, en un lugar seguro, fresco y seco.

MAXFORCE®
Forte

13. Primeros Auxilios

• Si entra en contacto con los ojos mantener el ojo abierto y enjuagar lenta y suavemente con agua durante 15 minutos. Si entra en contacto con la ropa o la piel, quitar la ropa contaminada y lavarla en forma separada. Enjuagar la piel inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos. En caso de intoxicación concurrir al médico toxicológico llevando la etiqueta y/o folleto adjunto.

14. Consultas en Caso de Intoxicación

• Centro de Información Toxicológica CITUC +56-22635 3800
• Emergencia Química y Toxicológica: CHEMTREC +56-22581 4934
• DIGAR. +56-22248 5331 (L-V de 9:00 a 18:00)

Nota: Este producto se elabora según estrictas normas de calidad. El vendedor no asume responsabilidad alguna, implícita o explícita, por daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o de no haberse observado las precauciones recomendadas.

Importado y distribuido en Chile por: Agroservicios Capurro SpA., Condell N°997, comuna de Limache, región de Valparaíso, Chile.

envu®

+56 332516774
@envuprofesional
www.ar.envu.com/chile
ventas@agroservicioscapurro.cl

Titular Registro:
Díaz y García Ltda. (DIGAR) Badajoz 100, Ofi. 1212 Las Condes, Santiago. Tel: 22248 5331. Envu y el logotipo de Envu son marcas comerciales propiedad de Environmental Science U.S. LLC o de una de sus filiales. ©2024. Environmental Science U.S. LLC