TEMPRID® SC



FICHA TÉCNICA

1. Resumen del producto

Temprid SC® combina dos principios activos exclusivos con la tecnología Envu®, que actúan de manera simultánea sobre el sistema nervioso del insecto. Esta acción dual permite un control eficaz y sostenido, resultando fundamental para el manejo de resistencia y su incorporación en programas de rotación de productos.

Composición	Imidacloprid 21% - Beta-Ciflutrina 10,5%
Uso	Profesional
Denominación	Insecticida Residual para Rastreros y Voladores
Formulación	Suspensión Concentrada
Registro ISP	N° P-1054/25
Clase Toxicologia	III
Formato (presentación)	250 cm 3

2. Modo de Acción

Por contacto e ingestión, a nivel de sistema nervioso central.

TEMPRID® SC

3. Plagas que controla

Plagas	Dilución cm^3 Temprid en 1 litro agua	Rendimiento frasco 250 cm^3
Cucarachas *Blattella sp. Periplaneta sp.*	2	*2500 m^2*
Garrapata *Amblyomma sp.*	4	*1250 m^2*
Pulga *Ctenocephalides sp.*	4	*1250 m^2*
Araña *Loxosceles sp.*	4	*1250 m^2*
Mosca *Musca domestica*	4	*1250 m^2*
Mosquitos *Culex sp. Aedes aegypti*	4	*1250 m^2*

4. Modo de Uso

1)Agitar el frasco

2)Utilizar la dosis correcta dependiendo de la plaga y la cantidad de emulsión a preparar.

3)Pulverizar las superficies previamente identificadas. Interiores: zócalos, rejillas, cajones, alacenas, bajo mesadas, pisos, paredes, muebles y Exteriores: paredes, zócalos, pasto y arbustos perimetrales.

4)Para el control de insectos voladores en exteriores establecer los horarios de mayor actividad de los mismos. Ej: Zancudos efectuar los tratamientos temprano por la mañana (5 a 8 h) o por la tarde (18 a 21 h).

envu®

TEMPRID® SC

5. Recomendaciones pre - aplicación

Mediante el monitoreo de plaga Identificar los posibles lugares a tratar.
Vaciar todas las alacenas, bajo mesadas y cajones donde se quiera pulverizar el producto.
Retirar todo tipo de alimentos.

6. Recomendaciones en la aplicación

Durante la aplicación solo el operario estará presente en el lugar a tratar.
Preferentemente usar guantes, ropa protectora adecuada y máscara
No comer, beber ni fumar durante la manipulación del producto.

7. Recomendaciones post - aplicación

Después de usarlo lavarse las manos con agua y jabón.
Dejar transcurrir un lapso mínimo de aproximadamente 2 horas entre aplicación y reingreso al lugar tratado.
Extremar las precauciones de reingreso al lugar tratado de niños de corta edad, ancianos, alérgicos y asmáticos.
Prolongar el reingreso en más de 3 horas en caso de tener animales domésticos: tortugas; iguanas; conejos; lagartijas, etc.
No lavar las superficies aplicadas durante 3 a 10 días posteriores a la aplicación

8. Intervalo entre aplicaciones

Cada 10 - 20 a 30 días dependiendo de la infestación presente.

9. Efecto Insecticida

El efecto insecticida de Temprid® SC comenzará aproximadamente a las 24 horas después de aplicado.

envu®

TEMPRID® SC

10. Seguridad

No pulverizar artefactos eléctricos; animales domésticos, colchones, sábanas, cobertores, ropas, juguetes, peceras, lugares donde se preparen o elaboren alimentos (mesadas), entre otros.

11. Riesgos ambientales

Evitar que entre en contacto con las aguas superficiales, alcantarillado y aguas subterráneas.

12. Almacenamiento

Mantener guardado este producto solo en su envase original bien cerrado, en lugar seguro, fresco y seco. Alejado de niños, personas inexpertas y mascotas.

13. Primeros Auxilios

- En caso de ingestión accidental, concurrir al médico llevando este prospecto y el envase.
- Por salpicaduras en ojos, enjuagarlos con agua limpia durante 15 minutos, en piel, lavar con abundante agua y jabón.
- Si se inhala el olor en exceso, retirar a la persona a un lugar ventilado.

14. Consultas en Caso de Intoxicación

- Centro de Información Toxicológica CITUC +56-22635 3800
- Emergencia Química y Toxicológica: CHEMTREC +56-22581 4934
- DIGAR. +56-22248 5331 (L-V de 9:00 a 18:00)

Nota: Este producto se elabora según estrictas normas de calidad. El vendedor no asume responsabilidad alguna, implícita o explícita, por daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o de no haberse observado las precauciones recomendadas.

Importado y distribuido en Chile por: Agroservicios Capurro SpA., Condell N°997, comuna de Limache, región de Valparaíso, Chile.

envu®

+56 332516774

envuprofesional

www.ar.envu.com/chile

ventas@agroservicioscapurro.cl

Titular Registro:
Díaz y García Ltda. (DIGAR) Badajoz 100, Ofi. 1212 Las Condes, Santiago. Tel: 22248 5331. Envu y el logotipo de Envu son marcas comerciales propiedad de Environmental Science U.S. LLC o de una de sus filiales. ©2024. Environmental Science U.S. LLC